

Schede faunistiche di approfondimento – **Testuggine comune**

Ordine: Testudini
Famiglia: Testudinidi
Genere: Testudo
Specie: *Testudo hermanni*

<i>Origine zoogeografica</i>	Europea
<i>Areale di distribuzione</i>	Sardegna, Corsica Spagna orientale, Baleari, Provenza, Arcipelago toscano, coste tirreniche, Sicilia, Isole Pelagie, costa adriatica. In Sardegna la sua presenza viene fatta risalire ai tempi preistorico – storici.
<i>Identificazione</i>	Carapace molto ossificato e bombato; arti colonnari e tozzi con dita riunite in un moncone da cui sporgono solo le unghie. Coda provvista di astuccio corneo, due scudi sopracaudali. La colorazione degli scudi presenta delle macchie scure molto estese su fondo giallo; nel piastrone le macchie scure formano due bande laterali pressoché continue. I maschi raggiungono una lunghezza del carapace di circa 18 cm., le femmine 20 cm.. Il peso degli adulti si aggira intorno ai 5 Kg.. I maschi hanno il piastrone è concavo mentre nelle femmine è piatto.
<i>Habitat ed ecologia</i>	Vive nella boscaglia, fino ai 1000 m., quasi sempre in zone esposte a meridione, con leggere pendenze. Il letargo dura 4-5 mesi. Si nutre di foglie di fillirea, corbezzolo, mirto, lentisco, etc., di varie specie di erbacee, di funghi, gasteropodi. In natura vive dai 15 ai 30 anni. E' predata dalla volpe, dal cinghiale, dal gatto selvatico e dai rapaci diurni.
<i>Riproduzione</i>	Gli accoppiamenti avvengono tra marzo e ottobre, generalmente tra la fine di aprile e quella di luglio la femmina depone da 2 a 5 uova ellissoidali, con guscio bianco e calcareo. Ogni femmina può deporre fino a 12 uova in due o più buche, l'incubazione dura circa due mesi. I maschi raggiungono la maturità sessuale intorno ai 10-13 anni, le femmine tra i 13-14 anni.
<i>Status di conservazione</i>	Specie rara a livello regionale e nazionale, localmente comune. Vulnerabile a livello europeo.
<i>Grado di protezione</i>	Convenz. di Berna, All.II; Dir.CEE 43/92, All. B,D; L.R. 23/98.